

клоп

Коричнево-мраморный клоп (*Nauphoeta callosa* Stål) - чрезвычайно опасный карантинный многоядный вредитель, повреждающий более 300 видов растений. Вывлечен на Черноморском побережье РФ. Распространяется с помощью транспортных средств и с грузами, особенно со строительными конструкциями, саженцами, растениями. Кроме того возможен завоз пассажирами в багаж



кладка яиц

личинка (нимфа)



взрослое насекомое (имаго)



Антракноз земляники (*Colletotrichum acutatum* J.H. Simmonds) поражает

широкий круг растений, более чем 40 семейств, в том числе бобовые, овощные, фруктовые, древесно-кустарниковые и травянистые. Основной культурой для данного патогена является земляника садовая (клубника). Потери урожая и растений достигают 80%, повреждает все части растения. Распространяется посадочным материалом.



Бактериальное увядание винограда

(*Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos Willems et al.)), заболевание отсутствует на территории РФ. Бактерия поражает исключительно виноград. Основным источником распространения инфекции на дальние расстояния является зараженный посадочный материал. На небольшие расстояния патоген распространяется через орудия и машины при обрезке и обработке растений; от растения к растению с соком и водой. Симптомы используются для определения бактериального увядания винограда могут развиваться на всех наземных частях растения.



В случае выявления подозрительного объекта, необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан по телефону горячей линии 8(8722) 780304